



SISTEMA DUNAR DE NERGA

| | | | |
|-------------|--|----------|---------------|
| Longitud: | 620 m | Anchura: | Media: 140 m |
| | | | Máxima: 250 m |
| | | | Mínima: 20 m |
| Altura: | Media (9 m) | | |
| Superficie: | Sistema dunar primario y secundario: 33.000 m ² | | |
| | Sistema terciario: 36.000 m ² | | |

Descripción:

Sistema dunar caracterizado por poseer un frente móvil de gran extensión. Se sitúa en el extremo oriental de la ensenada de Barra, limitado al este por los granitos de punta de A Igrexiña y al oeste por los de punta Mexilloeira, que lo separan del sistema de Viño-Barra. Algunos pequeños arroyos vierten o colapsan en esta zona, cuyo aporte de materiales contribuyó a la constitución del sistema dunar. Desde la trasduna hacia el interior continua un manto de arena remontante, más potente en ambos extremos del sistema. Las

comunidades vegetales de arribazón y de duna primaria no están extensamente representadas. Por el contrario, las formaciones de duna blanca o secundaria ocupan grandes superficies, no limitándose a formar un cordón paralelo a la línea de costa. Al estar relativamente poco fijada la duna, se favorece la expansión de plantas que prosperan bien en la duna móvil, como la muy abundante rubia de mar y la azucena de mar. Sin embargo, la especie más característica de este medio, el barrón, aparece poco compacto, lo que evidencia cierta degradación. En estas zonas abunda la corregüela de playa y el alhelí

La transición hacia la duna terciaria o gris es paulatina. Se manifiesta en un mosaico de la formación anterior con el matorral bajo de arenas semifijas, con la escobilla parda y el carrasco bravo como especies dominantes. Comunidades más sensibles, como la de musgos y plantas anuales como las silenes de litoral y las violetas quedan restringidas a ciertos puntos, alternando con áreas con vegetación rala de melga de

mar. En las inmediaciones de uno de los regatos se forman depresiones húmedas que dan lugar a un cañaveral. La parte trasera está fijada con pinos, entre los que prosperan restos de comunidades de duna terciaria y de matorral de dunas, con jaguarzo, tojo y retama loca.

Diagnóstico:

Espacio incluido en la Zona de Especial Protección de los Valores Naturales de Costa da Vela. A pesar de presentar una evidente alteración, alberga hábitats y especies dunares de interés. Aunque existen pasarelas de acceso y vallas entre el aparcamiento oriental y las dunas, gran parte del espacio presenta signos de erosión (en perfiles de duna y en vaguadas) y pérdida de vegetación, con comunidades vegetales algo empobrecidas. Se detectan acumulaciones de basura y hogueras practicadas por visitantes estivales. Los pinos se expanden sobre la duna semifija. Aparecen especies alóctonas invasoras, como las acacias.